

## La chasse de la bécasse en Corrèze

La chasse à la bécasse est pratiquée par des spécialistes durant toute la période d'hivernage au chien d'arrêt.

D'autres chasseurs plus généralistes peuvent la tirer en chassant à la billebaude ou au cul levé.

La pression de chasse est forte car la bécasse est quasiment le seul oiseau naturel chassable au chien d'arrêt présent dans notre département.

Les prélèvements sont limités à travers un Prélèvement Maximum Autorisé (PMA) de 3 oiseaux par jour et 30 oiseaux par an et par chasseur.



Chien à l'arrêt

## Les actions cynégétiques en faveur de la bécasse

Un réseau de professionnels de la Fédération Départementale des Chasseurs 19, de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), des bénévoles d'associations spécialisées (comme le Club National des Bécassiers et Bécassiers De France) effectuent un travail régulier sur cet oiseau :

- Des baguages d'oiseaux durant l'hivernage;
- Des comptages à la croûle pour connaître la fréquentation au moment de la reproduction;
- Des suivis, lors des sorties de chasse, de l'indice cynégétique d'abondance.

En cas de vague de froid, un protocole national peut être appliqué conduisant si besoin à une suspension de la chasse pour une période de 10 jours consécutifs, renouvelable si besoin.



Baguage d'une bécasse

# L A B É C A S S E D E S B O I S



Fédération Départementale des Chasseurs de la Corrèze

Quartier Montana - 19150 Laguenne

05 55 29 95 75 / [www.chasse-correze.fr](http://www.chasse-correze.fr)

*Scolopax rusticola*  
Famille des Scolopacidae

## Description

*Taille* : 33 à 35 cm

*Envergure* : 55 à 60 cm

*Poids* : 250 à 420 gr

La bécasse des bois est un oiseau trapu au plumage brun-rouge rappelant la couleur des feuilles mortes. Ce plumage lui permet de se dissimuler parfaitement dans son habitat. La tête est ronde avec un long bec droit. Son oeil positionné au sommet du crâne lui permet d'avoir un champ de vision très étendu. Les ailes sont courtes et arrondies, et la queue est très large.

Aucun caractère externe ne différencie le mâle de la femelle. En revanche, l'examen du plumage des ailes permet de distinguer les jeunes des adultes.

*Longévité* : jusqu'à 10 ans



## Régime alimentaire

La bécasse des bois se nourrit en fouillant profondément à l'aide de son long bec souple, l'humus des sous bois et le sol des prairies. Les vers de terre constituent sa nourriture principale mais elle consomme également des petits mollusques et des larves qu'elle trouve sous les feuilles.

## Habitat

Son aire de répartition est vaste : la Russie, la Scandinavie, les pays de l'est et toute l'Europe jusqu'à la Méditerranée. Elle occupe des milieux très variés, avec des forêts de résineux, de feuillus ou mixtes avec présence de points d'eau à proximité.

En Corrèze, elle fréquente aussi bien les plantations résineuses que les taillis épais, les boqueteaux ou encore le Causse. La multitude de sources et de zones humides corréziennes lui sont favorables et les nombreuses prairies lui servent de zones d'alimentation.



## Reproduction

La période de reproduction s'étale de mars à août. Durant cette période, les mâles survolent leur territoire en « piolant »; on appelle ce chant la croule. Ils recherchent et tentent d'attirer les femelles.

La nidification se déroule de mi-février à août. La femelle pond 4 oeufs de mi-mars à mai en général dans un nid garni de feuilles mortes disposé à même le sol en milieu boisé.

Seule la femelle couve. L'incubation des oeufs dure 22 jours. Les jeunes bécasseaux sont nidifuges (quittent le nid dès l'éclosion) et ont une croissance très rapide.

La bécasse niche en Corrèze au dessus de 600m d'altitude.

## Comportement

La bécasse est un oiseau migrateur discret.

Elle est solitaire, excepté pendant la migration où elle forme de petits groupes.

La migration d'automne se déroule dès le mois d'octobre selon les conditions météorologiques du moment; elle peut s'étaler jusqu'en décembre. (les premières bécasses arrivent vers la mi octobre en Corrèze). L'hivernage dure plusieurs mois jusqu'en mars-avril, où la migration de printemps débute. Durant l'hiver, il existe des mouvements importants à l'intérieur de notre pays, liés aux conditions météorologiques, notamment le gel.



## Tendance évolutive

De nombreuses études sont menées pour évaluer la tendance d'évolution de la population à travers des opérations de baguage mais aussi suivant le nombre de bécasses rencontrées par les chasseurs lors de chacune de leurs sorties. Les différentes études montrent que les effectifs sont plutôt stables.